



Özel EKOL HASTANESİ

GÜVENLİ DOĞUM KONTROL LİSTESİ



HASTANIN ADI SOYADI :	
DOĞUM TARİHİ :	
DOSYA NUMARASI :	
BAŞVURU TARİHİ :	

I. BAŞVURU SIRASINDA

Annenin sevk edilmesi gerekiyor mu? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, planlandı	Kurumun sevk kriterlerini kontrol edin.
Partograf başlatıldı mı? <input type="checkbox"/> Hayır, 4 cm ve üstünde başlayacak <input type="checkbox"/> Evet, planlandı	Serviks 4 cm iken işaretlemeye başlayın, Serviks her 1 saatte en az 1 cm genişlemelidir. • Her 30 dk: Kalp atışını, kontraksiyonu, fetal kalp atışını, • Her 2 saat: Vücut sıcaklığın, • Her 4 saat: Kan basıncını, işaretleyin.
Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	Herhangi bir ilaç vermeden önce alerjileri sorgulayın.
Antibiyotik? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Aşağıdaki durumlarda anneye antibiyotik verin: • Annenin vücut sıcaklığı ≥ 38 °C ise • Kötü kokulu vajinal akıntı öyküsü varsa • Membranların yırtılmasından sonra >18 saat geçmişse • B grubu streptokoklu yenidoğan enfeksiyonu öyküsü varsa • 37 hafta altındaki doğumlarda
Magnezyum sülfat? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Şu durumlarda anneye Magnezyum sülfat verin: • Diastolik kan basıncı 110 mmHg ve üzerinde ise (Proteinüriden bağımsız olarak) • Diastolik kan basıncı 90 mmHg ve üzerinde ise ve beraberinde şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu veya epigastrik ağrı varsa (Proteinüriden bağımsız olarak)
Antihipertansif tedavi? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Annenin sistolik kan basıncı 160mmHg üzerinde ise antihipertansif tedavi verin ve kan basıncını 150 / 100 mmHg altında tutun.
Kortikosteroid? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Doğum eylemi 34 hafta + 6 günlük gebelik haftası veya öncesinde başlamış ise anneye verilir.
Anti-retroviral? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, ilaç başlandı <input type="checkbox"/> Durum bilinmiyor, HIV testi istendi	Referans laboratuvarında HIV doğrulama testi pozitif olan annelere verilir.
<input type="checkbox"/> Her vajinal muayenede el hijyeni ve eldiven kullanımı için yeterli malzeme mevcut mu?	
Partograf başlatıldı mı? <input type="checkbox"/> Hayır, 4 cm ve üstünde başlayacak <input type="checkbox"/> Evet, planlandı	
Refakatçi doğumda bulunması için teşvik edildi mi? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır, kurum politikalarına uygun değil	
Annenin veya refakatçinin doğum sırasında gerektiğinde sağlık çalışanından yardım isteyeceğinden emin olun <input type="checkbox"/>	Annenin veya refakatçinin sağlık çalışanından yardım isteyeceği asgari durumlar: • Kanama • Şiddetli karın ağrısı • Şiddetli baş ağrısı veya görme bozukluğu • İdrar yapamama • İkınma isteği
Kontrolü Yapan (İsim, unvan, imza):	

II. DOĞUMDAN ÖNCE (Normal Doğum veya Sezaryenden Önce)

Gerektiği durumda doğuma yardım etmesi için yeterli sayıda sağlık çalışanı tanımlanıp ilgili kişiler bilgilendirildi mi (Bebek bakımı ile doğuma yardım için çağırılacak sağlık çalışanı ayrı olacak şekilde tanımlama yapılmalıdır)? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	
Kanama durdurucu balon (Bakri balon) doğumhanede mevcut mu? <input type="checkbox"/> Evet (kullanıma ilişkin eğitim almış personel mevcut) <input type="checkbox"/> Evet (Kullanıma ilişkin eğitim almış personel yok) <input type="checkbox"/> Hayır	
Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	Herhangi bir ilaç vermeden önce alerjileri sorgulayın.
Antibiyotik? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi <input type="checkbox"/> Başvuru anında başlanmıştı	Aşağıdaki durumlarda anneye antibiyotik verin: • Annenin vücut sıcaklığı ≥ 38 °C ise • Kötü kokulu vajinal akıntı öyküsü varsa • Membranların yırtılmasından sonra >18 saat geçmişse • B grubu streptokoklu yenidoğan enfeksiyonu öyküsü varsa • 37 hafta altındaki doğumlarda
Magnezyum sülfat? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi <input type="checkbox"/> Başvuru anında başlanmıştı	Şu durumlarda anneye Magnezyum sülfat verin: • Diastolik kan basıncı 110 mmHg ve üzerinde ise (Proteinüriden bağımsız olarak) • Diastolik kan basıncı 90 mmHg ve üzerinde ise ve beraberinde şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu veya epigastrik ağrı varsa (Proteinüriden bağımsız olarak)
Antihipertansif tedavi? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi <input type="checkbox"/> Başvuru anında başlanmıştı	Annenin sistolik kan basıncı 160mmHg üzerinde ise antihipertansif tedavi verin ve kan basıncını 150 / 100 mmHg altında tutun.
Gerekli malzemeler anne yatağı yanında kullanıma hazır mı?	
Anne için: <input type="checkbox"/> Eldivenler <input type="checkbox"/> Alkol bazlı el antiseptiği veya sabun ve temiz su <input type="checkbox"/> 10 IU enjektörde oksitosin (soğuk zincir uygulandığından emin ol)	Doğumdan hemen sonra annenin bakımı için hazırlanın: Sadece tek bebek olduğunu (çoklu doğum olmadığını) doğrulayın. 1. Doğumdan sonra 1 dakika içinde oksitosin verin. 2. Doğumdan 1-30 dakika sonra plasentayı çıkarın. 3. Plaseenta çıktıktan sonra uterusu masaj yapın. 4. Uterusun kasıldığını doğrulayın
Bebek için: <input type="checkbox"/> Temiz havlular <input type="checkbox"/> Göbek bağının kesilmesi için bistüri (steril bıçak) ve göbek klempini veya ip <input type="checkbox"/> Aspirasyon malzemeleri (puar, steril gazlı bez, gerekirse kullanılacak üzere aspiratör ve aspirasyon sondası) <input type="checkbox"/> Balon - maske tercihen T parça canlandırıcı	Bebek bakımına doğumun hemen sonrası için hazırlanın: 1. Bebeği kurulayın ve sıcak tutun. 2. Nefes almıyorsa, uyarı verin ve hava yolunu temizleyin. 3. Nefes almama devam ediyorsa: • Göbek bağını kesin • Balon maske veya T parça canlandırıcı ile ventilasyon yapın • Yardım isteyin
Kontrolü Yapan (İsim, unvan, imza):	

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DH.LS.03	11.01.2021	00	-	1/2

III. DOĞUMDAN HEMEN SONRA (İlk 1 Saat İçinde)

Doğumun 3. evresi aktif olarak yönetiliyor mu? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Postpartum her hastada doğumdan hemen sonra IV uterotopik (oksitosin) infüzyonuna başlayın, kontrollü kord traksiyonuyla plasentayı alın, fundusa masaj yapın
Annede anormal kanama var mı? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, yardım çağırıldı	Anormal kanama varsa: • Uterusa masaj yapın • Daha fazla uterotonik vermeyi planlayın • IV sıvı başlayın ve anneyi sıcak tutun • Nedene yönelik tedavi yapın: uterin atoni, plasenta/parça kalması, vajinal yırtık, uterus rüptürü
Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	Herhangi bir ilaç vermeden önce alerjileri sorgulayın.
Antibiyotik? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Aşağıdaki durumlarda anneye antibiyotik verin: • Annenin vücut sıcaklığı $\geq 38^{\circ}\text{C}$ veya plasenta elle çıkarılmış ise buna eşlik eden; • Üşüme, titreme varsa • Kötü kokulu vajinal akıntı öyküsü varsa • Annede 3. veya 4. derece perine yırtığı oluşmuşsa
Magnezyum sülfat? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Şu durumlarda anneye Magnezyum sülfat verin: • Diastolik kan basıncı 110 mmHg ve üzerinde ise (Proteinüriden bağımsız olarak) • Diastolik kan basıncı 90 mmHg ve üzerinde ise ve beraberinde şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu veya epigastrik ağrı varsa (Proteinüriden bağımsız olarak)
Antihipertansif tedavi? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	Annenin sistolik kan basıncı 160mmHg üzerinde ise antihipertansif tedavi verin ve kan basıncını 150 / 100 mmHg altında tutun.
Bebeğin sevk edilmesi gerekiyor mu? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, planlandı	Kurumun sevk kriterlerini kontrol edin.
Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	Doğum sırasında anneye maternal enfeksiyon tedavisi için antibiyotik verilmişse veya bebekte aşağıdakilerden biri varsa, antibiyotik verin: • Solunum $>60/\text{dk}$ veya $<30/\text{dk}$ ise • Göğüste çekilme, inlemeli solunum veya konvülsiyon varsa • Uyarıyla zayıf hareketler varsa • Bebeğin vücut sıcaklığı $<35^{\circ}\text{C}$ (ısıttıktan sonra yükselmiyor) veya $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ise
Antibiyotik? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, verildi	
Anti-retroviral? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, ilaç başlandı	Referans laboratuvarında HIV doğrulama testi pozitif olan annelerin bebeklerine verilir.
Bebeğin özel bakım veya takibe ihtiyacı var mı? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet, planlandı	Aşağıdaki durumlarda bebek için özel bakım/izlem planlayın: • >1 ay erken doğum varsa • Doğum ağırlığı <2500 gram veya >4000 gram ise • Antibiyotik ihtiyacı varsa • Restitasyon gerekli ise
İlk 30 dakika içinde emzirme ve cilt temasına başlandı mı (anne ve bebeğin sağlık durumları iyiyse)? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır, 30 dakikadan sonra başlandı	
Annenin veya refakatçinin doğum sırasında gerektiğinde sağlık çalışanından yardım isteyeceğinden emin olun <input type="checkbox"/>	Annede; • Kanama • Ciddi abdominal ağrı • Şiddetli baş ağrısı • Görüş bozukluğu • Nefes almada güçlük • Şiddetli bacak ağrısı • Ateş, titreme • Defekasyonda güçlük
Kontrollü Yapan (İsim, unvan, imza):	Bebekte; • Hızlı veya zor nefes alma • Beslenmenin kesilmesi • Hareketlerinde azalma • Tüm vücudun sarı olması • İdrar veya gaita çıkışı olmaması

IV. TABURCULUK ÖNCESİNDE

<input type="checkbox"/> Normal doğumdan sonra 24 saat, sezaryenden sonra ise 48 saat kurumda kalınmasını sağlayın.			
Annenin kanaması kontrol altına alındı mı? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır (Tedavi edin ve taburcuycu erteleyin)	Annenin nabızı 110/dk üzeri ve kan basıncı 90 mmHg altı ise IV tedavi başlayın, sıcak tutun ve hipovolemik şok açısından dikkat edin.		
Annenin kan basıncı normal mi? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır (Tedavi edin ve taburcuycu erteleyin)	Şu durumlarda anneye Magnezyum sülfat verin: • Diastolik kan basıncı 110 mmHg ve üzerinde ise (proteinüriden bağımsız olarak) • Diastolik kan basıncı 90 mmHg ve üzerinde ise ve beraberinde şiddetli baş ağrısı ve görme bozukluğu veya epigastrik ağrı varsa (proteinüriden bağımsız olarak) Sistolik KB >160 mmHg ise antihipertansif ilaç verin Amaç KB'nı $<150/100$ mmHg tutmak.		
Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	Herhangi bir ilaç vermeden önce alerjileri sorgulayın.		
Antibiyotik? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet (İlaç verin ve taburculuğu erteleyin)	Aşağıdaki durumlarda anneye antibiyotik verin ve taburculuğunu erteleyin: • Annenin vücut sıcaklığı $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ve buna eşlik eden; • Üşüme, titreme varsa • Kötü kokulu vajinal akıntı öyküsü varsa		
Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	• Solunumun çok hızlı (dakikada 60 üstünde) veya çok düşük (dakikada 30 altında) olduğu durumlarda • Göğüste hırıltı sesinin, konvülsiyonların olduğu durumlarda • Hareket veya uyarana cevap verilmeyen durumlarda • Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35°C 'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38°C 'nin üstünde olduğu durumlarda • Göbek bağının çevresinde cilde doğru kırmızlaşma olması durumlarında bebeğe antibiyotik verin.		
Antibiyotik? <input type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> Evet (Taburculuğu erteleyin, ileri bakımı planlayın, ilaç verin)			
Bebek iyi besleniyor mu? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır (İyi emzirme uygulamalarını gerçekleştirin ve taburculuğu erteleyin)			
Anneye aile planlaması seçeneklerinin sunulması gerekiyor mu? <input type="checkbox"/> Evet, bilgilendirme yapıldı <input type="checkbox"/> Hayır			
Doğum sonrası için kontrol/takip ayarlaması yapıldı mı? <input type="checkbox"/> Evet, planlama yapıldı <input type="checkbox"/> Hayır			
Annenin veya refakatçinin doğum sırasında gerektiğinde sağlık çalışanından yardım isteyeceğinden emin olun <input type="checkbox"/>	Annede; • Kanama • Ciddi abdominal ağrı • Şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu • Nefes almada güçlük	• Şiddetli bacak ağrısı • Ateş • Titreme • Defekasyonda güçlük • Bebeğin bakımını sürekli reddetme	Bebekte; • Hızlı veya zor nefes alma • Ateş • Normal dışı soğukluk • Beslenmenin durması • Hareketlerinde azalma veya tüm vücudun sarı olması
Kontrollü Yapan (İsim, unvan, imza):			

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
DH.LS.03	11.01.2021	00	-	2/2