



Özel EKOL HASTANESİ
RİSK DÜZEYİNE GÖRE VAJİNAL DOĞUM
SONRASI VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE)
PROFİLAKSİSİ UYGULANMA ORANI
GÖSTERGE KARTI



RİSK DÜZEYİNE GÖRE VAJİNAL DOĞUM SONRASI VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ UYGULANMA ORANI

Gösterge Kodu	HSTN.GKG48
Göstergenin Kısa Tanımı	Vajinal doğum yapan ve VTE yönünden riskli olan kadınlarda, doğum sonrası VTE profilaksisi uygulananların oranını ifade etmektedir.
Amaç	Vajinal doğum yapan kadınların VTE yönünden değerlendirilmesini ve olası en erken dönemde gerekli müdahalenin yapılmasını sağlamak.
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; (Paydada yer alan hastalar içinde vajinal doğum sonrası VTE profilaksisi uygulanan hasta sayısı / VTE yönünden riskli olan ve vajinal doğum yapılan toplam hasta sayısı) x 100
Alt İndikatörler	-Hekim bazında vajinal doğum sonrası VTE profilaksisi uygulanma oranı
Hedef Değer	%85'in üzerinde tutmak.
Veri Kaynağı	Bildirime Dayalı; Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Veri Toplama Formu
İlgili Formlar	* Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Veri Toplama Formu * Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Aylık Analiz Formu * Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı 3 Aylık Analiz Formu * Risk Düzeyine Göre Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı Yıllık Analiz Formu
Veri Toplama Periyodu	Aylık
Veri Analiz Periyodu	Aylık, 3 Aylık, Yıllık
Veri Giriş Periyodu	3 Aylık
Sorumlular	Kadın Hastalıkları ve Doğum Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	Hasta Güvenliği Komitesi, Yönetim Kurulu

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
Gl.YD.50	01.01.2021	01	03.01.2022	1 / 2



Özel EKOL HASTANESİ
RİSK DÜZEYİNE GÖRE VAJİNAL DOĞUM
SONRASI VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE)
PROFİLAKSİSİ UYGULANMA ORANI
GÖSTERGE KARTI



Dikkat Edilecek Hususlar

-Venöz Tromboemboli (VTE) için Risk Faktörleri:

- Antenatal dönemde toplam ≥ 4 ise 1.trimesterden itibaren tromboprofilaksi önerilir.
- Antenatal dönemde toplam puan 3 ise 28. gebelik haftasından itibaren tromboprofilaksi önerilir.
- Postnatal dönemde toplam puan ≥ 2 ise en az 10 gün süreyle tromboprofilaksi önerilir.
- Antenatal dönemde hastaneye yatış durumunda tromboprofilaksi önerilir.
- Puerperium döneminde hastanede uzun yatış (≥ 3 gün) veya tekrar hastaneye yatış durumunda tromboprofilaksi önerilir.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>Gl.YD.50</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>01</i>	<i>03.01.2022</i>	<i>2 / 2</i>