



Özel Ekol Hastanesi
İLAÇ SAKLAMA SÜRELERİ LİSTESİ



İLACIN ADI	KULLANIM SÜRELERİ	KULLANIM YÖNTEMİ	SAKLAMA KOŞULLARI
CITANEST FLAKON	Açıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.
MARCAIN FLAKON	Açıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.
HEPARİN FLAKON	Açıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.
POMAD	Açıldıktan sonra son kullanma tarihine kadar	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır. Bozulduğundan şüphe edilen pomad hastaya özel olmalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.
İNSÜLİN FLAKON	Açıldıktan sonra 28 gün (4 hafta)	Tekrar kullanımdan önce giriş yeri %70 Alkol ile temizlenir ve kuruması beklenir.	Üzerine açılış tarihi ve son kullanma yazılır.
ŞURUP	Açıldıktan sonra son kullanma tarihine kadar	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır. Bozulduğundan şüphe edilen şurup hastaya özel olmalıdır.	Oda sıcaklığında 25 °C altında muhafaza edilir.
ŞURUP (GRANÜLLÜ)	Açıldıktan sonra 10 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Oda sıcaklığında 25 °C altında muhafaza edilir. Üzerine açılış ve son kullanma tarihi yazılır.
GÖZ DAMLASI	Açıldıktan sonra 15 gün	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Oda sıcaklığında 25 °C altında muhafaza edilir. Üzerine açılış ve son kullanma tarihi yazılır.
İZOTONİK 100 cc	Açıldıktan sonra 24 saat	Tekrar kullanılabilmesi için sterilitesi bozulmamalıdır.	Üzerine açılış tarihi ve saati yazılır.