

Adı Soyadı:	Yaş:
Servis/Oda No:	Cinsiyet:
Prot. No:	Enfeksiyon:
Yatış tarihi:	Kan Grubu:
Tanı:	

Işık Açılış Saati:	Küvöz Isısı:
Işık Kapanış Saati:	SPO2:
Vücut Isısı:	İşlem Öncesi Bilirubin Düzeyi:
Kalp Tepe Atımı:	Ara Kontrol Bilirubin Düzeyi:
Solunum Sayısı:	İşlem Sonrası Bilirubin Düzeyi:

İşlem Öncesi Hazırlıkta Hemşirelik Girişimleri	Hemşire İmza
1.Fototerapi için ışık kaynağı açılmadan önce alet ayarlandı.	
2. Işık kaynağı kapatıldı ve bırakılmadı.	
3. Işık kaynağı 45-50 cm yükseklikte ayarlandı.	
4. Küvöz ısı ayarlandı. (Bebeğin vücut ısısına göre, ör; 36.6-36.7)	
5. Bebeğin vücut ısısı, yaşam bulguları, tartısı alınıp kayıt edildi.	
6. Bebekten bilirubin düzeyi için kan örneği alındı.	
7. Bebek çıplak yatırıldı - Gözler fototerapi gözlüğüyle kapatıldı - Genital organlar kapatıldı.	
8. Işık cihazı açılıp küvöz kolluk kapakları sıkıca kapatıldı.	
9. Foto başlama saati, işlemin ne kadar sürdüğü kayıt edildi.	
10. İşlem sırasında yapılan uygulamalar aileye anlatıldı.	

İşlem Sırası Hemşirelik Girişimleri	Hemşire İmza
1. Fototerapi gözlüğünün yerinde olup olmadığı kontrol edildi.	
2. Göz kontrolleri yapıldı. (Akıntı, kızarıklık)	
3. Steril su ve steril gaz bezi ile göz temizliği yapıldı.	
4. Bilirubin düzeyi kontrolü için kan örneği alınırken ışık kaynağı kapatıldı.	
5. Günde 2 kez tartı takibi yapıldı.	
6. Her 2 saatte bir ısı takibi, her 4 saatte bir diğer yaşam bulguları alındı. (Mönitör takibi)	
7. Her 3 saatte bir aldığı-çıkarıldığı takibi yapıldı. (Dışkı özelliği, sayısı kayıt edildi.)	
8. Dehidratasyon belirtileri gözlemlendi. (Deri turgor tonüsü azalması, fontanelde çökme... vb)	
9. Bilirubin nedeniyle dışkı yumuşak, yeşilimtrak, veya koyu kahverengi özellikte olabilir. Gözlenip kayıt edildi.	
10. Ciltte bronzlaşma, böcek ısırmasına benzer döküntüler görülebilir. Gözlenip kayıt edildi.	
11. Cildin temiz ve kuru olması sağlandı	
12. Ciltte oluşabilecek eritem, tahriş, yanıklar gözlenip kayıt edildi. Bu bulguların görülmemesi için önlemler alındı.	
13. Her 2-3 saatte bir pozisyon değiştirildi.	
14. Genel durumu sık sık gözlemlendi. (Özellikle titreme ve huzursuzluk varlığı)	

İşlem Sonrası Hemşirelik Girişimleri	Hemşire İmza
1. Bebek en az 2-3 gün dehidratasyon belirtileri yönünden gözlenip rapor edildi.	
2. Bebeğin tartısı, vücut ısısı ve diğer yaşam bulguları alınıp kayıt edildi.	
3. Bebekten bilirubin düzeyi kontrolü için kan alındı.	

Takip Eden Hemşire Adı Soyadı		İmza		
Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HB.FR.27	1.01.2008	2	13.01.2016	1/1