



Özel EKOL HASTANESİ

İTAKİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ



TARİH :	
SERVİS ADI :	
HASTANIN ADI SOYADI :	
YAŞI / CİNSİYETİ :	

DEĞERLENDİRME GEREKÇESİ:	1	İlk Değerlendirme	2	Post-Op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği
Parametreler	Risk Faktörleri	Puan	İlk Değerlendirme	Yeniden Değerlendirme (Tarih - Gerçekçe Numarası)						
		/20..../20..../20..../20..../20....			
YAŞ	60-69 yaş	1	()	()	()	()	()	()	()	
	70-79 yaş	2	()	()	()	()	()	()	()	
	80 ve üstü	3	()	()	()	()	()	()	()	
BİLİNÇ DURUMU	Bilinci kapalı.	1	()	()	()	()	()	()	()	
	Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.)	2	()	()	()	()	()	()	()	
DÜŞME HİKAYESİ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.	3	()	()	()	()	()	()	()	
HASTALIKLAR / KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet, artrit, osteoporoz, kırıklar)	Hastalıklardan en fazla ikisi bulunmaktadır.	1	()	()	()	()	()	()	()	
	Hastalıklardan 3 ve daha fazlası bulunmaktadır.	2	()	()	()	()	()	()	()	
HAREKET KABİLİYETİ	Ayakta / yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var	5	()	()	()	()	()	()	()	
	Ayakta / yürürken denge bozukluğu var.	10	()	()	()	()	()	()	()	
	Baş dönmesi var.	2	()	()	()	()	()	()	()	
BOŞALTIM İHTİYACI	Üriner / Fekal kontinans bozukluğu var.	1	()	()	()	()	()	()	()	
GÖRME DURUMU	Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.)	2	()	()	()	()	()	()	()	
	İleri derecede görme engeli var.	10	()	()	()	()	()	()	()	
İLAÇ KULLANIMI	4'den fazla ilaç kullanımı var.	2	()	()	()	()	()	()	()	
	Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var.	2	()	()	()	()	()	()	()	
	Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var.	3	()	()	()	()	()	()	()	
EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketlerini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley kateter, göğüs tüpü vb.)	Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var.	1	()	()	()	()	()	()	()	
	Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var.	2	()	()	()	()	()	()	()	
TOPLAM PUAN:										
HEMŞİRE NOTU (Hastanın düşme riski ile ilgili yukarıda bulunmayan önemli bir durum varsa belirtiniz.)										
RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU:	Düşük Risk	0-9 Puan Arasında	Yüksek Risk	10 Puan ve Üzeri						

Değerlendirmeyi yapan Hemşire Ad-Soyad/İmza:



NOT:

- *Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.
- *İtaki II Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır
- *Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Riski Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
HB.FR.01	01.01.2021	00	-	1/1