



Karar sınırı olarak verilebilecek öncelikli parametreler aşağıda belirtilmiştir:

Glukoz (Açlık kan glukozu, tokluk kan glukozu, oral glukoz yükleme testleri (Diyabet tarama erişkin, diyabet tarama gebelik)),

Total kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserit,

HbA1c,

Glukoz (Açlık) Karar Sınırları <70 mg/dL  
Hipoglisemi, 100-125 mg/dL  
Bozulmuş açlık glukozu, ≥126 mg/dL Diyabet.

Glukoz (Tokluk) Karar Sınırı <140 mg/dL

Sağlıklı bireylerde glukoz toleransı:

Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) :Karar Sınırı 2 saat sonra >200 mg/dL Diyabet.

Gestasyonel Diyabet Tarama ve Tanı Testleri Karar Sınırları :

I- İki aşamalı gestasyonel diyabet tarama ve tanı testi karar sınırları

a) İlk aşama: Gebeliğin 24.-28. haftalarında rastgele bir zamanda 50 g glukozlu testte 1.saat glukozu ≥ 140 mg/dL

b) İkinci aşama: 100 g glukozlu Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (en az 2 patolojik değer tanı koydurur.)

Açlık glukozu (APG) ≥95 mg/dL,

1. saat glukozu ≥180 mg/dL,
2. saat glukozu ≥155 mg/dL,
3. saat glukozu ≥140 mg/dL.

II: Tek aşamalı gestasyonel diyabet tarama ve tanı testi karar sınırları

75 g glukozlu Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) (en az 1 patolojik değer tanı koydurur.)

- 1.Açlık glukozu (APG) ≥ 92 mg/dL,
1. saat glukozu ≥180 mg/dL,
2. saat glukozu ≥153 mg/dL

Total kolesterol >200 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski.

LDL Kolesterol >130 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski.

HDL Kolesterol <40 mg/dL (Erkek) Kardiyovasküler hastalık riski.  
<50 mg/dL (Kadın) Kardiyovasküler hastalık riski.

Trigliserit >150 mg/dL Kardiyovasküler hastalık riski.

HbA1c Referans aralık: %3.5 - % 5.6 (15 – 38 mmol/mol)

Karar sınırları < % 5.7 (39 mmol/mol) Normal,

% 5.7 - 6.4 (39 - 46 mmol/mol) Prediyabet,

≥ % 6.5 (48 mmol/mol) Diyabet

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
BL.LS.05	22.10.2019	00	-	1 / 1