d. Yenidoğan Skalası (Cries Skalası / 0-4 ay çocuklar için kullanılabilir.)

	0	1	2	SKOR
Son saatteki uyku düzeyi	Daha uzun	Kısa (5-10 dk)	Hiç uyumadı	
Yüzündeki ağrı ifadeleri	Sakin	Daha az belirgin	Belirgin	
Ağlama özellikleri	Ağlamıyor	Uyaranlarla azaltılabiliyor	Şiddetli, tiz sesli	
Spontan motor aktivite	Normal	Orta derecede	Çırpınma sürekli hareketler	
Uyaranlara cevap ve exitabilitesi	Sessiz	Uyarana aşırı cevap	Tremorlu, klonik hareketler	
El-ayak parmaklarının flexionu	Yok	Daha az belirgin, ara ara	Belirgin ve sürekli	
Emme	Güçlü, susuyor	Ara ara (3-4) ağlama ile duruyor	Yok veya organize değil	
Tonüs	Normal	Orta derecede hipertonik	Hipertonik	
Sakinleştirme	1 dk içinde sakin	1 dk çabadan sonra sakin	2 dk çabadan sonra hiç yok	
Sosyal Temas(öz temas)	Kolay, uzun süreli	Zor	Yok	
			Toplam Puan	

Ağrı Derecesi	Yenidoğan Skalası	Yeniden Değerlendirme Sıklığı
Ağrı yok	0-4 puan	2x1
Hafif ağrı	5-10	4x1
Orta şiddetli ağrı	11-15	2 saatte bir
Şiddetli ağrı	16 dan büyük	Saatte bir

İlaç Uygulamalarından Sonra Yeniden Değerlendirme
Oral ilaç,rectal : 1 saat sonra
Intravenöz İlaç: 15 dakika
İntramuskuler İlaç:45 dakika
Supkutan İlaç:30 dakika
Cerrahi Müdahele sonrası
İlk 6 saatte : Saatte 1 defa, 24 saate kadar 4 saatte 1 defa

TEDAVİ

Tarih	Saat	Farmakolojik Yöntem		Nonfarmakolojik Yöntem (hemşirelik girişimleri)	Ağrı Skoru	Komplikasyon	Hemşire / Onay
		İlaç	veriliş yolu				