



Özel Ekol Hastanesi

GENİTAL KONDİLOM AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU



<i>Doküman No</i> HD.RB.193	<i>Yayın Tarihi</i> 10.07.2025	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 1 / 4
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

Klinik Adı:
Hastanın Adı-Soyadı:
Doğum tarihi:
Dosya No:

Ana adı:
Baba adı:
TC Kimlik No:

Sayın Hasta, Sayın Veli /Vasi;

Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayın. Genital siğilin (Kondilomun) cerrahi tedavisi genel, spinal veya lokal anestezi altında yapılabilir. Saha temizliği sonrası kondilom (Genital Siğiller) boyutuna ve hastalığınızın durumuna göre cerrahi olarak çıkarılabilir, koter veya karbondioksit lazer uygulanması ile yakılabilir. Siğil eksizyonunda siğil tabanından bistüri ile kesilerek çıkarılır. Koter ile kanama kontrolü sonrası sütür ile kesi yeri dikilir. Siğiller koter ile veya karbondioksit lazer ile direk yakılabilir.

İşlem Hakkında Genel Bilgi:

Human Papilloma Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğile (Kondilom) neden olan bir virüsdür. Bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzında kansere, erkeklerde penis derisi kanserine ve her iki cinsiyette anal ve orofarangeal kansere neden olabilir. Kanserler yavaş, yıllar içinde gelişir. Siğillerin ortaya çıkması kişinin bağışıklığı ile ilişkilidir. Erkeklerde siğil ortaya çıkmasa bile bulaştırabilir. Tedavisinde boyutuna göre ilaç tedavisi, dondurma, yakma veya cerrahi eksizyon yapılabilir. Tedavi sonrası sıklıkla tekrarlayabilir. Başarılı tedavi sonrasında bile bulaşıcılık devam edilebilir.

İşlemden Beklenen Favdalar

Genital siğilin (kondilomun) cerrahi tedavisi genel, spinal veya lokal anestezi altında yapılabilir. Saha temizliği sonrası kondilom (genital siğiller) boyutuna ve hastalığınızın durumuna göre cerrahi olarak çıkarılabilir. koter veya karbondioksit lazer uygulanması ile yakılabilir. Siğil eksizyonunda siğil tabanından bistüri ile kesilerek çıkarılır. koter ile kanama kontrolü sonrası sütür ile kesi yeri dikilir. Siğiller koter ile veya karbondioksit lazer ile direk yakılabilir.

Girişimin Yapılmaması Durumunda Neler Olabilir?

Bir kısım siğil gerilemekle birlikte siğiller daha da büyüyebilir. Yaygın siğil olması bulaşıcılığı arttırabilir ve kötü bir görünüme neden olabilir.

Nasıl Bir Tedavi / Girişim Uygulanacak?

Ameliyat yöntemine yukarıda değinilmiştir. Alternatif olarak takip edilebilir, takipte özellikle küçük lezyonlar geçebilir. Lezyon üzerine sürülen ilaç tedavisi (İmiquimod, Podophyllin ve Podofilox, Trichloroasetik Asit) verilebilir. Başarı oranı %30 - %80 arasındadır. Eritem, irritasyon, ülserasyon, yanma, ağrıya neden olabilir. Dondurma (Kryoterapi) yapılabilir. Başarı oranı %60 - %90' dır. Uygulama alanında ağrı ve su toplamasına neden olabilir. Tekrarlama oranı %20 - %40' dır.

Hastanın Girişimin Şekli, Zamanı, Yan Etkileri, Başarı Oranı ve Başarıdan Ne Kastedildiği, Girişim Sonrası İle İlgili Soruları:

- Ameliyatta beklenen başarı, bütün siğillerin alınması veya yakılmasıdır.
- Ameliyatın başarı oranı hastalığın boyutuyla ilgili olmakla birlikte %35 - %70' dir
- Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler / komplikasyonlar mevcut olup, bunlar yukarıda belirtilmiştir.
- Girişim sonrası her şeyin yolunda gitmesi durumunda hasta, aynı gün taburcu edilir.



Özel Ekol Hastanesi

GENİTAL KONDİLOM AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU



Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.193	10.07.2025	00	-	2 / 4

İşlemin Varsa Alternatifleri:

Günümüzde, mide tümörü tedavisinde bilinen tek yol cerrahinin bu tipini içermektedir.

İşlemin Riskleri ve Komplikasyonları:

Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler / komplikasyonlar vardır.

- 1- Tedavi yerinde ağrı sık görülür. Ağrı kesici tedavisi ile genellikle geçer.
- 2- Ameliyat bölgesinde kanama nadiren görülür.
- 3- %70' e varan oranda kondilom ortadan kaldırılabilir.
- 4- %20 düzeldikten sonra tekrarlayabilir.
- 5- Ameliyat bölgesinde sıklıkla skar (Yara İzii) gelişir.
- 6- Tedaviye yetersiz yanıt olabilir.
- 7- Tedavi sırasında fark edilmeyen milimetrik lezyonlar işlem sonrası büyüyebilir.
- 8- Tedavi, hastalığa neden olan virüsü (HPV) ortadan kaldırmayabilir.
- 9- Hastalığa neden olan virüsün bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Tedavi eşe bulaşmayı engellemeyebilir.
- 10- Hastalığa neden olan virüsün bazı alt tipleri penis ve anal bölge tümörüne neden olabilir.

Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler :

Human Papilloma Virüs (HPV) insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğile (kondilom) neden olan bir virüstür. Bazı alt tipleri kadınlarda rahim ağzında kansere, erkeklerde penis derisi kanserine ve her iki cinsiyette anal ve orofarengeal kansere neden olabilir. Kanserler yavaş, yıllar içinde gelişir. Siğillerin ortaya çıkması kişinin bağışıklığı ile ilişkilidir. Erkeklerde siğil ortaya çıkmaya bile bulaştırabilir. Tedavisinde boyutuna göre ilaç tedavisi, dondurma, yakma veya cerrahi eksizyon yapılabilir. Tedavi sonrası sıklıkla tekrarlayabilir. Başarılı tedavi sonrasında bile bulaşıcılık devam edebilir.

Girişimden Önce Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Genel ya da spinal anestezi planlanıyorsa, ameliyat olacağınız gecedan itibaren hiçbir şey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz.

Girişimden Sonra Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (At, Eşek vs.) binmemelisiniz. İlk 3 hafta cinsel İlişkide bulunmamalısınız. Hekimce önerilen perhiz ve ilaç tedavileri kullanılmalıdır.

 Ekol Hastanesi	Özel Ekol Hastanesi GENİTAL KONDİLOM AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU			
<i>Doküman No</i> HD.RB.193	<i>Yayın Tarihi</i> 10.07.2025	<i>Revizyon No</i> 00	<i>Revizyon Tarihi</i> -	<i>Sayfa No</i> 3 / 4

Hastaneden ayrılabilmeniz zaman: Bu zaman (hastanede kalma süreniz) operasyondan sonra ne kadar hızlı iyileşebileceğinize, operasyon türüne ve doktorunuzun kararına bağlı olacaktır.

Tahmini Süresi : 15-30 dakikadır

Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri:

Hastanede bulunduğum süre içerisinde tanı ve tedavi için kullanılacak ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl kullanılacağı) konusunda bilgi aldım.

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri:

Tedavim/Ameliyatım sonrasında yaşam tarzım için yapmam gerekenleri (Diyet, banyo, ilaç kullanımı, hareket durumu ve/veya kısıtlama durumu) ile ilgili bilgi aldım.

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbî Yardıma Nasıl Ulaşılabilir:

Sağlık mevzuatı gereği her bireyin hastane ve hekim seçme özgürlüğü vardır. Hastalığınızı oluşturan konuda, sosyal güvenceniz kapsamında resmi veya özel sağlık kuruluşlarında tıbbi yardıma ulaşabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat bizzat hastanemize başvurabileceğiniz gibi hastanemiz santrali (Tel: +90 284 236 10 10) aracılığıyla ameliyatı gerçekleştiren doktor veya başka bir uzman doktor ile irtibat kurup tıbbi destek alabilirsiniz. Acil durumlarda size en yakın bir sağlık kuruluşunda ya da acil çağrı merkezi (telefon: 112) aracılığıyla tıbbi yardıma ulaşmanız mümkündür.

Hasta, Veli veya Vasinin Onam Açıklaması:

- Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedavi seçenekleri, bunların riskleri, tedavi olmadığım takdirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edindim.
- Tedavi/girişimden önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim.
- Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum ve yapılacak girişime onay veriyorum.
- İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi durdurabileceğimi biliyorum.



Özel Ekol Hastanesi
GENİTAL KONDİLOM AYDINLATILMIŞ
ONAM FORMU



Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.193	10.07.2025	00	-	4 / 4

HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Yukarıda geçen hastalığıma ve yapılan tedaviye özgü kabul edilebilir komplikasyonlar dışında kalmamak şartıyla ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hukuki yola başvurmayacağım.)

Ben, bu formun içeriğini anladım Özel Ekol Hastanesi'nde uygulanacak olan işlemi bilincim yerinde olarak kabul ediyorum.

İmzası: _____ Tarih: _____ Saat: _____

Onay Hastanın Yasal Temsilcisinden Alındı ise;
Yasal Temsilcinin Yakınlık Derecesi:

Hastanın bilinci kapalı Hasta 18 yaşından küçük Hastanın karar verme yetisi yok
 Acil

Bilgilendirmeyi Yapan Hekimin;

Adı-Soyadı: _____ İmzası: _____ Tarih: _____ Saat: _____

Tercümanın (ihtiyaç duyulması halinde);

Adı-Soyadı: _____ İmzası: _____ Tarih: _____ Saat: _____

- 18 yaşın üzerindeki hastaların kendilerinden,
- 15-18 yaş arasındaki hastaların kendilerinden ve ayrıca yasal temsilcilerinden,
- Bilinci kapalı olan, 15 yaşın altında olan, tıbbi acil durumlarda ve karar verme yetisi bulunmayan hastaların yasal temsilcisinden rıza alınır.

Lütfen kendi el yazınız ile aşağıya **“Ben bu formun içeriğini anladım ve sormak istediğim başka bir şey yok.”** yazınız. Ve bir kez daha imzalayınız.

.....