



# Özel Ekol Hastanesi

## ÜRETER TAŞI OLAN HASTA İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU



**Klinik Adı:**  
**Hastanın Adı, Soyadı:**  
**Doğum tarihi:**

**Ana adı:**  
**Baba adı:**  
**TC Kimlik No:**

### Sayın hasta,Sayın Veli/Vası;

Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tanı ve tedavisi için size önerilen tüm tıbbi ve cerrahi uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Tıbbi tedavi ve cerrahi girişimlerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak uygulamaları kabul etmek ya da etmemek yine kendi kararınıza bağlıdır. Bu açıklamanın amacı, sizi korkutmak ya da endişelendirmek değil, sağlığınıza ile ilgili konularda sizi bilinçlendirerek alınacak karara katılımınızı sağlamaktır. Arzu ederseniz, sağlığınıza ilgili tüm bilgi ve dökümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz.

Bu işlem üreter (böbrekle mesane arasındaki idrar kanalı) alt uçtaki taşı yada taşları olan hastalara uygulanır. Üreter (böbrekle mesane arasındaki idrar kanalı) deki taşınızın kırılabilmesi için yaklaşık bir kalem kalınlığında metal bir tüp penis yada idrar kanalı ağzı içinden üretraya geçirilir. Sonra taşın bulunduğu üretere girilerek taş özel jeneratörden sağladığı enerjinin özel problemler aracılığı ile taşın kırılması esasına dayanır. İşlem genel yada spinal anestezi ile yapılabilir.

### A-GENEL RİSKLER

- Akciğerin küçük bölgeleri kapanabilir, bu da akciğer enfeksiyonu riskini artırabilir. Antibiyotik tedavisi ve fizyoterapi gerekebilir.
- Bu işlem üreter (böbrekle mesane arasındaki idrar kanalı) alt uçtaki taşı yada taşları olan hastalara uygulanır. Üreter (böbrekle mesane arasındaki idrar kanalı) deki taşınızın kırılabilmesi için yaklaşık bir kalem kalınlığında metal bir tüp penis yada idrar kanalı ağzı içinden üretraya geçirilir. Sonra taşın bulunduğu üretere girilerek taş özel jeneratörden sağladığı enerjinin özel problemler aracılığı ile taşın kırılması esasına dayanır. İşlem genel yada spinal anestezi ile yapılabilir.
- Kalbin yükünün artması nedeniyle kalp krizi gelişebilir.
- İşlem nedeniyle ölüm olabilir.

### B-BU AMELİYATLA İLGİLİ RİSKLER

- İşleme bağlı olarak nadiren üretra (idrarı mesaneden dışarı taşıyan yol) yaralanabilir. Yaralanma nedeniyle üretrada oluşacak hatalı bir kanal idrar yaparken zorlanmamıza veya idrar yapamamamıza, idrarın uzun süreli sızıntı şeklinde kaçmasına yada uzun dönemde üretrada darlık gelişmesine neden olabilir.
- İşlem sırasında mesane yaralanması nadir görülen bir durumdur ve cerrahi girişim gerektirebilir.
- Mesane çıkışında oluşacak ödem (dokuda su tutulması ve şişme) nedeniyle idrar yapılamazsa mesanede biriken idrarın oluşturacağı basınç artışı ağrıya yol açacaktır. Bu sorunun giderilmesi için üretral katater (idrar sondası) takılması gerekebilir.
- İşlem sırasında değişik kaynaklardan gelen mikroplar kan akımına karışarak ağır enfeksiyon tablosuna yol açabilir. Tedavisi antibiyotiklerdir.
- Mesane yada idrar yollarından köken alan kanama idrar rengini birkaç gün süre ile boyayabilir. İşlemeden sonraki birkaç gün geçici olarak idrar yaparken ağrı ve yanma hissedilebilir.
- Taşınız işlem sırasında böbreğinize doğru kaçarak üreterorenoskopun (Metal tüp şeklinde işlemin yapılmasını sağlayan alet) ulaşabileceği sınırın dışına çıkabilir. Bu durumda işleme son verilerek daha sonra yeniden denenebileceği gibi alternatif yöntemler gündeme gelebilir.
- Taşınızın çok sert ve dayanıklı minerallerden oluşması nedeniyle taşınız hiç yada kısmen kırılmayabilir.
- İşlem sonucu kırılan taşları idrar kanalından kendiniz düşüreceksiniz. Bu durumda ağrı olabilir ve size ağrı kesiciler verilecektir.
- Üretere giren alet üreter duvarını delerek dışarı çıkabilir. Delinmenin yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak ek girişim yapılmadan işlem sonlandırılabilir, üreter geçici olarak vücut içerisinde kalacak özel bir katater yerleştirilebilir veya açık cerrahi girişim ile delinen alan dikilerek kapatılabilir. Vücut içerisinde kateter bırakılması durumunda kateterin mesane içindeki ucu idrar hissi bozukluklarına, az yada çok idrarla kan gelmesine neden olabilir. Bu kateterler genellikle birkaç hafta içerisinde çıkarılır.
- Nadiren üreter hasar görebilir. Darlıklar oluşabilir ve ek cerrahi girişim gerekebilir.
- Cerrahiden sonra barsak hareketleri yavaşlayabilir ve tamamen durabilir. Bu barsakta sıvı birikimi sonucu şişkinlik ve kusmaya neden olabilir. Tedavi gerektirebilir.
- Sigara içenlerde ve/veya kilo fazlası olan kişilerde yara ve göğüs enfeksiyonları, kalp ve akciğer komplikasyonları ve trombüs açısından risk artmıştır.

**Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler** Hastalığınız böbreğinizdeki taşın mesaneye inişi sırasında üreter dediğimiz kanalda takılıp kalması ve idrar akımını kısmen yada tamamen engellemesi ile oluşmaktadır. Bu durumda şiddetli ağrı krizleri, idrarla beraber kanama, böbrekte enfeksiyon ve fonksiyon kaybı hatta bu enfeksiyonun kana yayılarak ağır enfeksiyon tablosuna (sepsisemi) ve böbreğin tamamen kaybına yol açabilir.

Döküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.115	01.01.2008	03	14.06.2016	1 / 3



# Özel Ekol Hastanesi

## ÜRETER TAŞI OLAN HASTA İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU



**Girişim yapılmaması durumunda neler olabilir?** Mevcut şikayetlerin artması ile birlikte şiddetli ağrı krizleri, idrarla beraber kanama, böbrekte enfeksiyon ve fonksiyon kaybı hatta bu enfeksiyonun kana yayılarak ağır enfeksiyon tablosuna (sepsis) ve böbreğin tamamen kaybına yol açabilir.

**Başarı oranı ve başarıdan ne kastedildiği** kanalı tıkayan taşın üreterin en dar yeri olan mesaneye girişine uygun boyuta gelinceye kadar kırılıp parçalara ayrılmasıdır.

**Girişimden önce dikkat edilmesi gerekenler.** Ameliyat olacağınız gecedan itibaren hiçbir şey yememelisiniz. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları 1 hafta önceden kesmelisiniz.

**Girişimde sonra hastanın dikkat etmesi gerekenler** Taşlarınız kırıldıktan sonra bunların idrar kanalından düşebilmesi için yürüyüşe, günlük 10-12 bardak sıvı alımına (2500-3000 cc) ihtiyaç vardır. Taş parçaları düşerken ağrıya, idrarda yanma ve sık gitme gibi şikayetlere, idrarla kanamaya sebep olabilir. Hekimce size önerilen ilaçlar kullanılmalıdır.

### Hekimin hasta hakkında bilmek istedikleri

Kullanılan İlaçlar:

Alerji:

### Hasta, veli veya vasinin onam açıklaması:

- Doktorum bana sağlık durumum il ilgili gerekli açıklamaları yaptı.
- Tedavi öncesi ve sonrası dikkat etmem gereken hususları anladım.
- Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı.
- Aklim başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum.

Yukarıda geçen hastalığıma ve yapılan tedaviye özgü kabul edilebilir komplikasyonlar dışında kalmamak şartıyla ameliyata bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hukuki yola başvurmayacağım.

Ben ....., bu formun içeriğini anladım Özel Ekol Hastanesi'nde uygulanacak olan işlemi bilincim yerinde olarak kabul ediyorum.			
İmzası:	Tarih:	Saat:	
Onay Hastanın Yasal Temsilcisinden Alındı ise; Yasal Temsilcinin Yakınlık Derecesi:			
<input type="checkbox"/> Hastanın bilinci kapalı	<input type="checkbox"/> Hasta 18 yaşından küçük	<input type="checkbox"/> Hastanın karar verme yetisi yok	<input type="checkbox"/> Acil
Bilgilendirmeyi Yapan Hekimin;			
Adı-Soyadı:	İmzası:	Tarih:	Saat:
Tercümanın (ihtiyaç duyulması halinde);			
Adı-Soyadı:	İmzası:	Tarih:	Saat:

- 18 yaşın üzerindeki hastaların kendilerinden, • 15-18 yaş arasındaki hastaların kendilerinden ve ayrıca yasal temsilcilerinden,
- Bilinci kapalı olan, 15 yaşın altında olan, tıbbi acil durumlarda ve karar verme yetisi bulunmayan hastaların yasal temsilcisinden rıza alınır.

### Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi ;

Lütfen kendi el yazınız ile aşağıya "Ben bu formun içeriğini anladım ve sormak istediğim başka bir şey yok." yazınız. Ve bir kez daha imzalayınız.

.....  
.....

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
HD.RB.115	01.01.2008	03	14.06.2016	2 / 3